

# リツキシマブ療法

## 治療スケジュール

|   | 外観                                                                                | お薬名                      | 薬の効果                       | スケジュール<br>(点滴時間)    |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------|
|   |                                                                                   |                          |                            | 1日目                 | 2-7日 |
| 1 |  | アセトアミノフェン錠<br>クロルフェニラミン錠 | インフュージョン<br>リアクション予防<br>の薬 | 内服                  | お休み  |
| 2 |  | リツキシマブ                   | 腫瘍の増殖を<br>抑える              | 医師が<br>指定する<br>点滴速度 | お休み  |

## 点滴時の過敏反応

点滴開始直後から2時間後頃に多くあらわれます。  
多くの場合、初回の治療中に起こり、2回目からは少なくなる傾向にあります。  
しかし、2回目以降に初めて副作用があらわれる場合や、それまでとは  
違う副作用があらわれる場合もあります。

副作用の主な症状

○発熱   ○悪寒（ふるえ）   ○発疹   ○かゆみ   ○痛み   ○頭痛  
○吐き気   ○動悸   ○脱力感   ○咳   ○息苦しさ



**\*これらのような症状があらわれた場合はすぐに看護師に伝えてください。**

名古屋記念病院